

Министерство здравоохранения Калининградской области Центр медицинской профилактики и реабилитации



# КЛЕЩЕВЫЕ ИНФЕКЦИИ ИН



Самыми распространенными болезнями, которые передаются клещами, являются клещевой энцефалит и боррелиоз (болезнь Лайма). Возможно заражение одновременно двумя инфекциями, что утяжеляет течение каждой из них.

# КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ



- Это заболевание, при котором в основном поражается центральная нервная система и в течение нескольких дней (около недели) способно привести к летальному исходу.
- Инкубационный период составляет от двух до четырех недель.
- Заболевание отрицательно сказывается на сером веществе и коре головного мозга, а также спинном мозге, отвечающем за опорно-двигательные функции организма.

#### Симптомы заболевания:

частые головные боли, повышение температуры тела до 39-40 градусов, ломота в теле, общее недомогание.

 Важно знать, что возбудитель клещевого вирусного энцефалита всегда находится в слюнных железах клеща и передаётся в первые же минуты кровососания. Поэтому чем быстрее снят клещ с тела, тем меньшую дозу возбудителя он передаст!





# ВАКЦИНАЦИЯ!

Прививка от КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА защитит от тяжелого течения болезни и риска стать инвалидом, если укусивший вас клещ окажется заразным

## Кому показана вакцинация?

Вакцинация показана клинически здоровым людям (детям с 12 месяцев), проживающим на эндемичной по клещевому энцефалиту территории или пребывающим на ней. Вакцинация против клещевого энцефалита включена в Календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

Назначить вакцинацию должен врач после соответствующего осмотра.

## Как правильно пройти вакцинацию?

Стандартная схема вакцинации клещевого энцефалита состоит из 3 доз, которые вводятся по схеме 0-1(3)-9(12) месяцев – для импортных, и 0-1(7)-(12) – для отечественных вакцин; ревакцинация проводится каждые 3 года. (Существует так же экстренная схема вакцинации).

Вакцинироваться против клещевого энцефалита можно круглый год, но планировать вакцинацию нужно таким образом, чтобы с момента второй прививки прошло не менее 2 недель до возможной встречи с клещом.

Наиболее опасны клещи в период с апреля по сентябрь, излюбленные места обитания - смешанные леса, меньше их в хвойных лесах без травяного покрова. По данным еженедельного мониторинга, в период с 5 по 12 июня по факту присасывания клещей в медицинские организации Калининградской области обращаются свыше 100 человек (из них 1/3 - дети).

Присасывание клещей зарегистрировано во всех административных территориях области - в 52% случаев присасывание клещей происходит на придомовых территориях населенных пунктов, 15,5% - садоводческих товариществ.



Удалённого клеща поместите в банку с мокрой тканью или травинкой и отнесите на лабораторное исследование в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Калининградской области», г. Калининград, ул. Космическая, 27.

## КЛЕЩЕВОЙ БОРРЕЛИОЗ



- Возбудителями клещевого боррелиоза являются спирохеты рода боррелий.
- Заражение клещевым боррелиозом происходит при укусе инфицированным клещом. Боррелии со слюной клеща попадают в кожу и в течение нескольких дней размножаются, после чего распространяются на другие участки кожи и внутренние органы (сердце, головной мозг, суставы и др.). Боррелии в течение длительного времени (годами) могут сохраняться в организме человека, обусловливая хроническое и рецидивирующее течение заболевания.

**Инкубационный период** (от момента присасывания клеща до появления симптомов) колеблется от 1 до 50 дней (чаще 7-10), но известны случаи, когда болезнь начинала проявляться только через девять месяцев.

#### Симптомы заболевания:

покраснение и мелкая сыпь вокруг места присасывания клеща в диаметре около десяти-пятнадцати сантиметров, сильный зуд. В дальнейшем возможно поражение центральной нервной и опорно-двигательной системы, которое может привести к серьёзным заболеваниям сердца.

 Для подтверждения диагноза производится исследование крови. При несвоевременном лечении болезнь переходит в хроническую форму.



Если клещ всё-таки укусил, И ВЫ НЕ ПРИВИТЫ, следует обратиться:



«Инфекционная больница Калининградской области» ул. Фрунзе, 48.

# КАК ИЗБЕЖАТЬ УКУСА КЛЕЩА

# Собираемся в лес:

- На голову лучше надеть капюшон, плотно пришитый к куртке. Волосы заправить под кепку или косынку
- 2 Одежда светлая, однотонная
- 3 Рукава длинные
- Воротник и манжеты должны плотно прилегать к телу
- Рубашку нужно заправить в брюки, брюки - в ботинки или носки на плотной резинке
- 6 На одежду нанести репеллент

# Как ходим по лесу:

- Не садимся и не ложимся на траву
- Каждые несколько часов осматриваем одежду, волосы и открытые участки тела





## Как выглядит:

это паукообразное насекомое с острым хоботком, имеет четыре пары конечностей.

#### Активность:

тёплое время года, с апреля апрель май по октябрь, пик активности - май-июнь.

## Размер:

от 3 до 25 мм в зависимости от вида.

